

神経学的検査チャート

年 月 日 時 分

患者氏名 _____
 患者ID _____
 患者性別 男 女 年齢 _____


- 1) 意識・精神状態 a) 意識 : 清明、異常 ()
 * Japan Coma Scale (1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300)
 * Glasgow Coma Scale (E 1, 2, 3, 4, V 1, 2, 3, 4, 5, M 1, 2, 3, 4, 5, 6 total)
 b) 検査への協力 : 協力的、非協力的
 c) けいれん : なし、あり ()
 d) 見当識 : 正常、障害 (時間、場所、人)
 e) 記憶 : 正常、障害 ()
 f) 数字の逆唱 : 286、3529
 g) 計算 : 100 - 7 = 93 - 7 = 86 - 7 =
 h) 失行 ()、失認 ()
 2) 言語 正常、失語 ()、構音障害 ()、嚔声、開鼻声
 3) 利き手 右、左
 4) 脳神経

	右	左
視力	正、低下	正、低下
視野	正、⊕	正、⊕
眼底	正常、動脈硬化()度、出血、白斑、うっ血乳頭、視神経萎縮	
眼裂	> = <	
眼瞼下垂	(-) (+)	(-) (+)
眼球位置	正、斜視()、偏視()、突出()	
眼球運動		
眼振		
複視	(-) (+) : 方向 ()	
瞳孔 大きさ	(正、縮、散) mm > = < mm (正、縮、散)	
形	正円、不正	正円、不正
対光反射	速、鈍、消失	速、鈍、消失
輻湊反射	正常、障害	
角膜反射	正常、障害	正常、障害
顔面感覚	正常、障害	正常、障害
上部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
下部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
聴力	正常、低下	正常、低下
めまい	(-) (+) : 回転性・非回転性 ()	
耳鳴り	(-) (+)	(-) (+)
軟口蓋	正常、麻痺	正常、麻痺
咽頭反射	(+) (-)	(+) (-)
嚥下	正常、障害()	
胸鎖乳突筋	正常、麻痺	正常、麻痺
上部僧帽筋	正常、麻痺	正常、麻痺
舌偏倚	(-) (+) : 偏倚 (右 左)	
舌萎縮	(-) (+)	(-) (+)
舌線維束性収縮	(-) (+)	

- 5) 運動系
- a) 筋ト一ヌス 上肢(右・左、正常 痙縮 強剛 低下) その他()
 下肢(右・左、正常 痙縮 強剛 低下)
 - b) 筋萎縮 (-) (+) : 部位 ()
 - c) 線維束性収縮 (-) (+) : 部位 ()
 - d) 関節 変形、拘縮 : 部位 ()
 - e) 不随意運動 (-) (+) : 部位 ()、性質 ()
 - f) 無動・運動緩慢 (-) (+)
 - g) 筋力 正常、麻痺 : 部位 ()、程度 ()

		右					左						右		左			
頸部屈曲	C1~6	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0	上肢バレー	(-)	(+)	(-)	(+)
伸展	C1~T1	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0	(下肢バレー)	(-)	(+)	(-)	(+)
三角筋	C5,6	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0	Mingazzini	(-)	(+)	(-)	(+)
上腕二頭筋	C5,6	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0	握力	kg		kg	
上腕三頭筋	C6~8	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0					
手関節背屈	C6~8	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0					
掌屈	C6~8,T1	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0					
母指対立筋	C8,T1	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0					
腸腰筋	L1~4	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0					
大腿四頭筋	L2~4	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0					
大腿屈筋群	L4,5,S1,2	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0					
前脛骨筋	L4,5	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0					
下腿三頭筋	S1,2	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0					

筋萎縮・感覚



- 6) 感覚系
- a) 触覚 正常、障害 : 部位 ()
 - b) 痛覚 正常、障害 : 部位 ()
 - c) 温度覚 正常、障害 : 部位 ()
 - d) 振動覚 正常、障害 : 部位 ()
 - e) 位置覚 正常、障害 : 部位 ()
 - f) 異常感覚・神経痛 (-) (+) : 部位 ()


7) 反射

	右		左			右		左			右		左	
ホフマン	(-)	(+)	(-)	(+)	バビンスキー	(-)	(+)	(-)	(+)		(-)	(+)	(-)	(+)
トレムナー	(-)	(+)	(-)	(+)	チャドック	(-)	(+)	(-)	(+)		(-)	(+)	(-)	(+)
(腹壁) 上					(膝クロ一ヌス)	(-)	(+)	(-)	(+)		(-)	(+)	(-)	(+)
下					足クロ一ヌス	(-)	(+)	(-)	(+)		(-)	(+)	(-)	(+)

8) 協調運動

	右		左	
指一鼻一指	正常	、拙劣	正常	、拙劣
かかと一膝	正常	、拙劣	正常	、拙劣
反復拮抗運動	正常	、拙劣	正常	、拙劣

- 9) 髄膜刺激徴候 項部硬直 (-) (+)、ケルニツヒ徴候 (-) (+)
- 10) 脊柱 正常、異常()、ラゼーグ徴候 (-) (+)
- 11) 姿勢 正常、異常()
- 12) 自律神経 排尿機能 正常、異常()
 排便機能 正常、異常()
 起立性低血圧 (-) (+)
- 13) 起立、歩行 ロンベルク試験 正常、異常、マン試験 正常、異常
 歩行 正常、異常()
 つぎ足歩行(可能・不可能)、しゃがみ立ち(可能・不可能)



神経学的所見のまとめ

.....

神経学的検査担当医師

署名 _____