

# 神経学的検査チャート

年 月 日 時 分

患者氏名

患者ID

患者性別 男 女 年齢


- 1) 意識・精神状態
- a) 意識 : 清明、異常 ( )  
 \* Japan Coma Scale ( 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300 )  
 \* Glasgow Coma Scale ( E 1, 2, 3, 4, V 1, 2, 3, 4, 5, M 1, 2, 3, 4, 5, 6 total )
  - b) 検査への協力 : 協力的、非協力的
  - c) けいれん : なし、あり ( )
  - d) 見当識 : 正常、障害 ( 時間、場所、人 )
  - e) 記憶 : 正常、障害 ( )
  - f) 数字の逆唱 : 286、3529
  - g) 計算 : 100 - 7 = 93 - 7 = 86 - 7 =
  - h) 失行 ( )、失認 ( )
- 2) 言語 正常、失語 ( )、構音障害 ( )、嗄声、開鼻声
- 3) 利き手 右、左
- 4) 脳神経

	右	左
視力	正、低下	正、低下
視野	正、⊕	正、⊕
眼底	正常、動脈硬化( )度、出血、白斑、うっ血乳頭、視神経萎縮	
眼裂	> = <	
眼瞼下垂	(-) (+)	(-) (+)
眼球位置	正、斜視( )、偏視( )、突出( )	
眼球運動	上直筋 下斜筋 外直筋     内直筋 下直筋 上斜筋	下斜筋 上直筋 内直筋     外直筋 上斜筋 下直筋
眼振		
複視	( - ) ( + ) : 方向 ( )	
瞳孔 大きさ	(正、縮、散) mm > = < mm (正、縮、散)	
形	正円、不正	正円、不正
対光反射	速、鈍、消失	速、鈍、消失
輻湊反射	正常、障害	
角膜反射	正常、障害	正常、障害
顔面感覚	正常、障害	正常、障害
上部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
下部顔面筋	正常、麻痺	正常、麻痺
聴力	正常、低下	正常、低下
めまい	( - ) ( + ) : 回転性・非回転性 ( )	
耳鳴り	( - ) ( + )	( - ) ( + )
軟口蓋	正常、麻痺	正常、麻痺
咽頭反射	( + ) ( - )	( + ) ( - )
嚥下	正常、障害( )	
胸鎖乳突筋	正常、麻痺	正常、麻痺
上部僧帽筋	正常、麻痺	正常、麻痺
舌偏倚	( - ) ( + ) : 偏倚 ( 右 左 )	
舌萎縮	( - ) ( + )	( - ) ( + )
舌線維束性収縮	( - ) ( + )	

- 5) 運動系
- a) 筋トーンス 上肢(右・左、正常 痙縮 強剛 低下) その他( )  
下肢(右・左、正常 痙縮 強剛 低下)
  - b) 筋萎縮 (－)(+) : 部位( )
  - c) 線維束性収縮 (－)(+) : 部位( )
  - d) 関節 変形、拘縮 : 部位( )
  - e) 不随意運動 (－)(+) : 部位( )、性質( )
  - f) 無動・運動緩慢 (－)(+) : 部位( )、程度( )
  - g) 筋力 正常、麻痺 : 部位( )、程度( )

		右					左						右	左		
頸部屈曲	C1~6	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0	上肢バレー	(-) (+)	(-) (+)
伸展	C1~T1	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0	(下肢バレー)	(-) (+)	(-) (+)
三角筋	C5,6	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0	Mingazzini	(-) (+)	(-) (+)
上腕二頭筋	C5,6	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0	握力	kg	kg
上腕三頭筋	C6~8	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0			
手関節背屈	C6~8	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0			
掌屈	C6~8,T1	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0			
母指対立筋	C8,T1	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0			
腸腰筋	L1~4	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0			
大腿四頭筋	L2~4	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0			
大腿屈筋群	L4,5,S1,2	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0			
前脛骨筋	L4,5	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0			
下腿三頭筋	S1,2	5	4	3	2	1	0	5	4	3	2	1	0			

筋萎縮・感覚




- 6) 感覚系
- a) 触覚 正常、障害 : 部位( )
  - b) 痛覚 正常、障害 : 部位( )
  - c) 温度覚 正常、障害 : 部位( )
  - d) 振動覚 正常、障害 : 部位( )
  - e) 位置覚 正常、障害 : 部位( )
  - f) 異常感覚・神経痛 (－)(+) : 部位( )

7) 反射

	右	左		右	左		右	左
ホフマン	(-) (+)	(-) (+)	バビンスキー	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)
トレムナー	(-) (+)	(-) (+)	チャドック	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)
(腹壁) 上			(膝クロ-ヌス)	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)
下			足クロ-ヌス	(-) (+)	(-) (+)		(-) (+)	(-) (+)

8) 協調運動

	右	左
指一鼻一指	正常、拙劣	正常、拙劣
かかと一膝	正常、拙劣	正常、拙劣
反復拮抗運動	正常、拙劣	正常、拙劣



- 9) 髄膜刺激徴候 項部硬直 (－)(+)、ケルニツヒ徴候 (－)(+)
- 10) 脊柱 正常、異常( )、ラゼーグ徴候 (－)(+)
- 11) 姿勢 正常、異常( )
- 12) 自律神経 排尿機能 正常、異常( )  
排便機能 正常、異常( )  
起立性低血圧 (－)(+)
- 13) 起立、歩行 ロンベルク試験 正常、異常、マン試験 正常、異常  
歩行 正常、異常( )  
つぎ足歩行(可能・不可能)、しゃがみ立ち(可能・不可能)

神経学的所見のまとめ

-----

神経学的検査担当医師

署名 \_\_\_\_\_